



## รายงานเตือนภัยการเกิดโรคไข้หวัดนกในต่างประเทศ พบโรคไข้หวัดนกระบาดในประเทศเวียดนาม และประเทศจีน

โรค Avian Influenza ที่เวียดนามพบมีการระบาดใน 11 จังหวัด คือ จังหวัด กว่างนาม(Quang Nam) กว่างจิ (Quang Tri) ห่าตั้ง(Ha Tinh) แทนฮว่า(Thanh Hao) ในภาคกลาง จังหวัดถาย-งเวียน( Thai Nguyen) ห่านาม(Ha Nam) บักชยาง(Bac Giang) และนครฟายฟ่อง(Hai Phong)ในภาคเหนือ จังหวัดหายชเวือง( Hai Duong) ในภาคใต้ และจังหวัดซ็อกจาง (Soc Trang) กับจังหวัดเกียนชยาง (Kien Giang) ในเขตที่ราบปากแม่น้ำโขงมีการฆ่าสัตว์ปีกแล้วกว่า 34,000 ตัว มีผู้เสียชีวิตจำนวน 2 คนตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2555 โรคไข้หวัดนกระบาดรุนแรงในเวียดนามตั้งแต่ปี 2546 ถึงปี 2550 เป็นต้นมา เริ่มปรากฏ Sub clade 2.3.4 และในปี 2552 มีการพบ Sub clade 2.3.2 เป็นครั้งแรก ช่วงหลายปีมานี้เวียดนามและจีนใช้วัคซีน H5N1-Re5 ฉีดป้องกันโรคไข้หวัดนก แต่วัคซีนนี้เริ่มใช้ไม่ได้กับ Sub clade 2.3.2 จีนกำลังเร่งพัฒนาวัคซีนใหม่ แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าการพัฒนาวัคซีนดังกล่าวสำเร็จหรือไม่ (จาก ASTV ผู้จัดการออนไลน์) จาก Promed mail ที่อินเดีย ห้องปฏิบัติการ High Security Animal Disease Laboratory (HSADL) รายงานอย่างเป็นทางการว่าอีกจำนวนนับร้อยตัวที่ตายในเมือง Bihar และบางส่วนที่ตายในเมือง Gaya

Banka Nawada Jamui Bhagalpur Munger และ Aurangabad มี  
สาเหตุจากการติดเชื้อไวรัส Avian Influenza A/H5N1 และได้แจ้งเตือน  
ประชาชนให้ถอยออกห่างจากบริเวณที่พบอีกาตาย ห้ามจับซากอีกาและให้  
แจ้งเจ้าหน้าที่รัฐ